



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

اختلال دو قطبی

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص

اختلال دو قطبی طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

❖ مراقبتها باید که بیمار با استی انجام دهد

✓ مراقبتها های زمان مصرف لیتیوم عبارتند از:

- درمان با لیتیوم باید توسط روانپزشک شروع شود. تعیین مقدار دقیق لیتیوم در بدن لازم است. مقدار کم آن بی اثر و مقدار زیاد آن سمی است. بنابراین باید به طور مرتب در چند هفته اول آزمایش خون دهید تا مطمئن شوید که از مقدار مناسبی استفاده می کنید. با ثابت شدن مقدار دارو پزشک می تواند لیتیوم را همراه با آزمایش خون منظم برای شما تجویز کند.
- مقدار لیتیوم در خون به مقدار آب بدن و داروهای مصرفی همزمان بستگی دارد. اگر آب بدن کم شود مقدار لیتیوم در خون بالا رفته و احتمال بروز اثرات منفی آن و یا حتی اثرات سمی آن وجود دارد. بنابراین آب بسیار بنوشید - مخصوصا در مواقعی که هوا گرم است و یا فعالیت شما زیاد است.
- چایی و قهوه کمتر مصرف کنید. چون آنها باعث افزایش ادرار می گردند.
- حداقل سه ماه یا بیشتر طول می کشد تا اثرات لیتیوم پدیدار شود. در این مدت با اینکه تغییر حالت روحی شما ادامه دارد باید به خوردن قرص های لیتیوم ادامه دهید.
- در صورت ایجاد اثرات جانبی دارو مانند تاری دید، ضعیف شدن ماهیچه های بدن، اسهال، لرزش ضعیف دستها، احساس بیمار بودن، استفراغ کردن، تلو تلو خوردن، لکنت زبان به پزشک مراجعه نمایید.
- استفاده طولانی از لیتیوم ممکن است به کلیه و غده تیروئید آسیب رساند. بهتر است هر چند ماه یکبار برای اطمینان از کارکرد صحیح آنها آزمایش داد.
- از رژیم غذایی مناسب استفاده کنید.
- نوشیدن نوشیدنی های غیر شیرین بسیار مفید است.
- اگر باردار هستید، بهتر است برای آگاهی از قطع یا ادامه مصرف لیتیوم با روانپزشک خود مشورت کنید.
- اگر لیتیوم مصرف می کنید، نباید به نوزاد شیر بدھید
- ✓ بطور کلی بهترین دارو به بیماری شما بستگی دارد. یک دارو ممکن است برای یک نفر مناسب باشد ولی در شخص دیگر اثر خوبی نداشته باشد. اما برای اولین تجویز اصولا دارویی تجویز می گردد که تاثیر بیشتری در دیگران نشان داده است.
- ✓ شما باید هر برنامه برای حاملگی را با روانپزشک خود در میان بگذارید. با هم فکری هم، شما می توانید برای کنترل حالات روحی خود در طول حاملگی و پس از تولد نوزاد برنامه ریزی کنید.
- ✓ در طول زمان حاملگی، تمام کسانی که با این موضوع در رابطه اند شامل: پزشک متخصص زنان- ماما- پزشک خانواده - روانپزشک و روانپرستار- باید با هم در ارتباط باشند.
- ✓ حتی پس از بهمودی بهتر است همواره این قرصها را با توجه به نظر روانپزشک همراه داشته باشید. اگر خیلی زود مصرف قرصها را ترک کنید، احتمال عود افسردگی در شما زیاد است. اگر شما به یکباره مصرف را قطع کنید، ممکن است دچار علایم ترک شوید.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

اختلال دو قطبی

- ✓ برای رانندگی در مدت مصرف باید با پزشک خود مشورت نمایید.
- ✓ نشانه های تغییر حالت خود را یاد بگیرید تا بتوانید در موقع مناسب کمک بگیرید. با اینکار شما می توانید از بروز کامل عارضه و یا بستری شدن در بیمارستان اجتناب کنید. نوشتن حالات روحی روزانه می تواند به شما در این کار کمک کند.
- ✓ تا می توانید در مورد بیماری تان و آنچه برای درمان آن مفید است اطلاعات کسب کنید.
- ✓ از شرایط تنش زا بپرهیزید. پرهیز کامل از تنش غیر ممکن است بنابر این بهتر است یاد بگیرید چگونه این شرایط را کنترل کنید. شما می توانید از سی دی یا دی وی دی های آموزشی و یا گروهای تمدد اعصاب و یا پیشنهادهای روانشناسان به استرس خود غلبه کنید.
- ✓ افسردگی یا شیدایی می توانند اثرات نامطلوبی بر دوستان و خانواده داشته باشد. شما ممکن است مجبور به بازسازی روابط تان بعد از یک دوره افسردگی یا شیدایی بشوید.
- ✓ داشتن حداقل یک نفر که بتوانید به او اعتماد کنید بسیار مفید است. دوستان و خانواده نیاز دارند بدانند که چه اتفاقی برای شما می افتد و آنها چه کاری می توانند برای شما انجام دهند.
- ✓ با پزشکان و مشاوران خود صادق باشید. پزشک خود را در جریان کامل وضعیت و حالات خود قرار داده و اطلاعات لازم در مورد روش درمانی خود را از وی بخواهید.
- ✓ ممکن است شما بخواهید قبل از اینکه دکتر دستور قطع دارو بدهد ، از ادامه مصرف خودداری کنید. متأسفانه اینکار اغلب به بازگشت دوره های بیماری منجر می شود.
- ✓ جهت جلوگیری از بی خوابی اقدامات زیر را انجام دهید:
 - فعالیت جسمانی کافی در طول روز و در صورت امکان ورزش مرتب مثلًاً دست کم سه روز در هفته و هر بار حداقل ۲۰ دقیقه داشته باشید.
 - از خواب روزانه بپرهیزید.
 - شبها قهوه نخورید.
 - مکان خوابیدن خود را تغییر ندهید.
 - هر صبح در ساعت مشخصی بیدار شوید فارغ از آن که شب در چه ساعتی به خواب رفته اید.
 - پیش از خوابیدن تلویزیون تماشا نکنید و غذای سنگین نخورید.
 - به جز برای خوابیدن مدتی طولانی را در بستر نگذرانید.
 - اگر به خواب نمی روید تقلای زیادی نکنید؛ مکان خواب را ترک کنید و چند دقیقه به فعالیتی مشغول شوید.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

دانشگاه تهران، دانشگاه هنر اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر، میان

اختلال دو قطبی

❖ مراقبت هایی که خانواده بیمار باید انجام دهد

- ✓ دانستن اینکه به افراد بسیار افسرده چه بگوییم سخت است. آنها همه چیز را از دیدگاه منفی می‌بینند و قادر نیستند بگویند از شما چه می‌خواهند.
- ✓ آنها ممکن است زودرنج و گوشه گیر باشند اما در همان حال به کمک شما نیاز دارند.
- ✓ آنها ممکن است نگران باشند ولی نخواهند یا نتوانند که نصیحت شما را بپذیرند. سعی کنید در حد امکان صبور باشید و آنان را درک کنید.
- ✓ در شروع یک دوره شیدایی، شخص شاد و پرانرژی به نظر می‌رسد. هرچند که اینگونه هیجانات منجر به بدتر شدن شرایط روحی آنان می‌گردد. بنابراین سعی کنید آنان را متلاعنه کنید که کمکشان نمایید و به آنان در مورد بیماری شان توضیح دهید.
- ✓ اطلاعات بیشتری در مورد اختلالات دو قطبی پیدا کنید. همراهی شما با بیمار در جلسات روانپزشکی بسیار موثر خواهد بود.
- ✓ به خودتان زمان و فضای کافی برای تجدید قوا بدهید. مطمئن باشید که زمان‌هایی برای خودتان و گذراندن با دوستانتان اختصاص داده اید.
- ✓ در صورتی که دوست یا فامیل شما در بیمارستان است، مدت نگهداری از انها را با دیگران تقسیم کنید. شما به دوستتان وقتی خسته نیستید بهتر می‌توانید کمک کنید.
- ✓ در موقع اضطراری مانند شیدایی یا افسرده‌گی شدید بیمار را سریعاً به یک مرکز درمانی منتقل نمایید.
- ✓ نام و شماره یک پزشک متخصص قابل اعتماد را داشته باشید.
- ✓ محدودیت‌های عزیزان را قبول کنید. مبتلایان دو قطبی نمی‌توانند خلق خود را کنترل کنند. نمی‌توانند به افسرده‌گی پایان دهند یا در زمان شیدایی، خود را کنترل کنند. نمی‌توان با کنترل خود، نیروی اراده و یا استدلال، بر افسرده‌گی یا شیدایی غلبه کرد.
- ✓ این بیماران نیاز به محبت شما دارند در محبت کردن و ابزار علاقه سعی کنید دوگانه رفتار نکنید برخی خانواده‌ها گاه به بیمار محبت می‌کنند گاه از او متنفر می‌شوند این کار صحیح نیست در موقع محبت کردن سعی کنید، چهره شما مثل کلامتان با محبت باشد.
- ✓ باید به فرد بیمار احترام گذاشت و به نکات مثبت او توجه کرد.
- ✓ با تشویق بیمار به خاطر کارهای مثبت و موفقیت‌هایی که به دست می‌آورد هر چقدر هم کوچک باشد به وی احساس عزت نفس ببخشید.
- ✓ سعی کنید در خانه کاری که ارزش دارد به او بدهید مهم نیست که همکاری او کم باشد مهم این است که در قبال کار اندکی که انجام می‌دهد او را تشویق نمایید.
- ✓ عدالت را در خانه رعایت نمایید و کارهای منزل را تقسیم کنید.
- ✓ سعی کنید در رفتارهای ثبات داشته باشید.



دستور العمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

اختلال دو قطبی

- ✓ سعی کنید که به بیمار مسئولیت بدھید تا حس استقلال پیدا بکند.
- ✓ سعی کنند در خانواده هایشان نظم و قانون وجود داشته باشد.
- ✓ از ایجاد سر و صدا و درگیری های هیجانی و موقعیت های استرس زا و مشاجرات خانوادگی پرهیز کنید.
- ✓ از سرزنش و بر چسب های منفی در ارتباط با وی استفاده نکنید.
- ✓ رفتارهای بیمار را به عنوان نشانه و علامت بیماری در نظر بگیرید.
- ✓ بیمار را حمایت کرده و نیاز به امنیت او را تامین کنید فرصت کافی به بیمار برای صحبت در مورد مشکلاتش بدھید و با او همدلی کنید.
- ✓ ارتباط منظم با روانشناس و روانپزشک داشته باشید.
- ✓ فرد بیمار را زیاد به خود وابسته نکنید و بیش از حد برای او دلسوزی نکنید.
- ✓ او را طرد نکنید و با او خصمانه برخورد نکنید.