



کد فرم: K(R.G)F14/11-02/0

عنوان فرم: آمادگی لازم جهت انجام سی تی آنژیو گرافی قلب جهت بیماران بستری

۱. بیمار از ۳ ساعت قبل ناشتا باشد
۲. در دست راست بیمار آنژیوکت سبز فیکس شود (حتما سبز و دست راست باشد)
۳. در صورت مصرف متفورمین از ۲۴ ساعت قبل و ۲۴ ساعت بعد از انجام سی تی آنژیو متفورمین قطع شود.
۴. مصرف آلپرازولام نیم میلی گرم به اندازه نصف قرص جهت کاهش استرس به بیمار داده شود.
۵. ضربان قلب بیمار با مصرف متورال تا زیر ۶۰ پایین بیاید (متورال را به فاصله هر ۴۵ دقیقه مصرف کند تا ضربان به زیر ۶۰ برسد).
۶. در صورت پایین نیامدن ضربان قلب با مصرف ۳ دوز متورال ، ۱ دوز ایندرال ۴۰ میلی گرمی مصرف کند .
۷. در صورت پایین نیامدن ضربان قلب بیمار به زیر ۶۰ ، به واحد سی تی آنژیو قلب اطلاع داده شود.
۸. در صورت داشتن حساسیت به تخم مرغ- ماهی- گوجه فرنگی- مواد غذایی ید دار- فلفل و ادویه و ... یا دارو پروتکل حساسیت حتما از ۱۳ ساعت قبل اجرا شود.
۹. بیمار لباس جلو باز داشته باشد .
۱۰. بیمار زیرپوش نداشته باشد و برای بیماران خانم لباس زیر خارج گردد.
۱۱. برای آقایان موهای قفسه سینه وشکم شیو شود.
۱۲. بیمار حتما با اینترن و پرونده به واحد سی تی آنژیو فرستاده شود.
۱۳. درخواست سیستمی سی تی آنژیو بیمار ثبت و با درخواست کتبی بیمار مطابقت داشته باشد.
۱۴. در گزارش پرستاری میزان متورال و ایندرال و آلپرازولام قبل از ارسال بیمار به واحد سی تی آنژیو جهت آگاهی پرسنل واحد مربوطه چارت شود و همچنین به اینترن نیز اطلاع داده شود.
۱۵. جواب Bun/Cr ضمیمه پرونده باشد و در صورت Cr بالاتر از ۱/۲ اخذ اکی از نفرولوژیست محترم الزامی می باشد.
۱۶. امکان انجام سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر برای بیماران دارای آریتمی مقدور نمی باشد ، لذا جهت رفع آریتمی بیماران با اتند قلب مشورت کرده و در صورت عدم رفع آریتمی ، بیمار به بخش سی تی آنژیو قلب انتقال داده نشود.