



راهنمای پرستاری

توصیه های عمومی پر تودرمانی

❖ توصیه های لازم جهت کاهش مشکلات پوستی

- ✓ در معرض هوا گذاشتن ناحیه تحت درمان تا حد امکان، به درمان پوست کمک خواهد کرد.
- ✓ از لباس های پنبه ای نرم و آزاد استفاده کنید.
- ✓ لباس هایی مانند کمرست و جوراب شلواری که تنگ یا مزاحم تبادل هوا هستند، نپوشید.
- ✓ پیش از استفاده از هرگونه عطر و یا کرم بر ناحیه درمان شده بهتر است با پزشک مشورت کنید.
- ✓ آفتاب گاهی حتی در روزهای ابری و زمانی که برای چند دقیقه بیرون از منزل هستید پوست شما را می سوزاند. به ساحل نروید و حمام آفتاب نگیرید.
- ✓ وقتی بیرون می رود، کلاه لبه بلند، پیراهن آستین بلند و شلوار بلند بپوشد.
- ✓ روی پوست ناحیه تحت درمان از باند، چسب زخم یا انواع دیگر نوار چسب استفاده نکنید.
- ✓ از مالیدن پوست در طی حمام گرفتن اجتناب نمایید. بعد از حمام کردن به آرامی به طور مناسب به پوست خشک خود دست بزنید.
- ✓ قرار دادن کرم های محلول در آب بر روی پوست ۲ بار در هفته، به ویژه بعد از استحمام توصیه می شود.
- ✓ از مصرف ادکلن و محلول بعد از اصلاح اجتناب کنید، زیرا حاوی الکل می باشد.
- ✓ اگر اصلاح می کنید، از ماشین اصلاح برقی استفاده کنید و از لوسیون قبل از اصلاح استفاده نکنید.
- ✓ اگر از نظر پزشک برای شما مشکلی وجود ندارد ۲-۳ لیتر مایع در طول روز مصرف کنید.
- ✓ از پوست خود در مقابل باد و سرما محافظت کنید از آب داغ و گرما اجتناب نمایید.

❖ چگونگی برخورد با خارش پوست

- ✓ روزانه مرتباً از کرم های مرطوب کننده استفاده کنید.
- ✓ پوست را در معرض حرارت قرار ندهید.
- ✓ جهت شستشو و استحمام از آب سرد یا ولرم استفاده کنید.
- ✓ اگر می خواهید حمام آب ولرم بروید، ترجیحاً یک روز در میان باشد و بیش تر از ۳۰ دقیقه در آب نماند.
- ✓ به آب حمام، نشاسته ذرت، جوش شیرین و پودر سویا اضافه نمایید.
- ✓ لباس های نخی سبک بپوشید.
- ✓ جهت خاراندن پوست از یک ماساژور یا فشار انگشت و دست روی ناحیه مورد نظر استفاده کنید.
- ✓ به کمک تکنیک های آرامش یافتن و حواس پرتی و خیال پردازی، خارش را کنترل کنید.
- ✓ از کیسه کشیدن و خاراندن ناحیه تحت درمان خودداری کند.
- ✓ مواد خیلی داغ یا خیلی سرد را روی پوست خود قرار ندهید. از کیسه آب گرم، کیسه یخ یا هر چیز داغ یا سرد دیگر در ناحیه تحت درمان استفاده نکنید.
- ✓ از صابون ملایم استفاده کنید و دقت کنید حاوی خوشبوکننده یا ضدبو نباشد.
- ✓ خود را با حوله لطیف و به آرامی خشک کنید، با حوله پوست را محکم مالش ندهید.
- ✓ فقط از لوسیون ها و محصولات آرایشی و بهداشتی که پزشک یا پرستار توصیه می کنند، استفاده کنید.



راهنمای پرستاری

توصیه های عمومی پر تودرمانی

- ✓ دقت کنید که نشانه‌های جوهری را که برای پر تودرمانی روی بدن شما مشخص شده است را پاک نکنید.
- ✓ پوست بیمار در محل‌های سرد و مرطوب حالت مطلوب تری دارد. می‌توانید با گذاشتن یک کاسه آب روی رادیاتور یا استفاده از دستگاه‌های بخور، اتاق‌ها را مرطوب کنید.
- ❖ **توصیه های لازم در کاهش تغییر رنگ پوست**
- ✓ با آب گرم، صابون ملایم و پارچه نرم پوست را به آرامی تمییز نمایید. نواحی قرمز رنگ یا دارای جوش را به دقت شستشو دهید و دستمال خشک روی آن قرار دهید.
- ✓ از پماد آد استفاده نمایید و تا هر زمانی که مقدور بود پوست خود را در معرض هوا قرار دهید.
- ✓ لباس های گشاد و نرم بپوشید.
- ✓ برای واکنش های پوستی داروهای تجویز شده توسط پزشک را استفاده نمایید.
- ✓ همه قسمت های پوست بدن خود را از نور خورشید محافظت کنید (به طور مثال به هنگام رفتن به بیرون کلاه لبه دار، عینک آفتابی و لباس های آستین بلند بپوشید).
- ✓ از کرم های ضد آفتاب با SPF 30 و یا بالاتر استفاده کنید در صورت تعریق و حمام آن را هر ۲ ساعت یکبار تجدید کنید.
- ❖ **توصیه های لازم جهت کاهش خستگی**
- ✓ استراحت مهم است اما پزشکان معمولاً به بیماران توصیه می‌کنند که تا حد امکان فعال باقی بمانند. دست کم شبی ۸ ساعت بخوابند.
- ✓ شاید در طول روز به چرت زدن نیاز داشته باشد. بسیاری بر این عقیده‌اند که یک استراحت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ای کمک تأثیر بسیاری در کاهش خستگی دارد. اگر می‌خواهد چرت بزند سعی کند کم‌تر از ۱ ساعت باشد.
- ✓ بین استراحت و فعالیت تعادل برقرار کنید.
- ✓ به جای این که همه فعالیت ها را یک باره انجام دهید، برای مهم ترین فعالیت ها در طول روز برنامه ریزی کنید.
- ✓ ورزش کنید. بسیاری از بیماران معتقدند با انجام ورزش سبک مانند پیاده‌روی، دوچرخه سواری و یوگا احساس بهتری پیدا می‌کنند. با پزشک یا پرستار درباره ورزش‌هایی که می‌توانید انجام دهید، صحبت کنید.
- ✓ به یاد داشته باشید که خستگی ناشی از درمان، کوتاه مدت است و بعد از اتمام درمان انرژی اغلب به آرامی باز می‌گردد.
- ✓ از دیگران برای پختن غذا و انجام کارهای خانه و محیط کار درخواست کمک کنید.
- ✓ یک رژیم غذایی متعادل حاوی پروتئین شامل: گوشت، تخم مرغ، پنیر و حبوبات مانند نخود و لوبیا را بخورید و حدود ۸ تا ۱۰ لیوان آب در روز بنوشید، مگر این که تیم مراقبت شما دستورالعمل های دیگری به شما بدهند.



راهنمای پرستاری

توصیه های عمومی پر تودرمانی

❖ توصیه های لازم جهت کاهش اضطراب و افسردگی

- ✓ با کسی که به او اعتماد دارد در مورد احساسات خود صحبت کنید. ممکن است دوست نزدیک، عضوی از خانواده، پرستار، مددکار اجتماعی یا روانشناس را انتخاب کنید. ممکن است دوست داشته باشید با کسی که پر تودرمانی می شود، صحبت کنید .
- ✓ به گروه حمایتی ملحق شوید. گروه های حمایتی سرطان گردهمایی هایی برای افراد مبتلا به سرطان دارند. این گروه ها بیمار را با افرادی آشنا می کنند که با آنها مشکل یکسانی دارد؛ درباره احساسات خود صحبت کنید و صحبت های دیگران را نیز بشنوید.
- ✓ از نماز، عبادت یا انواع دیگر حمایت معنوی استفاده کنید.
- ✓ تنفس عمیق و ورزش های آرامش سازی را چندین بار در روز انجام دهید. (به عنوان مثال، چشمانتان را ببندید، نفس عمیق بکشید، بر روی هر قسمت از بدن تمرکز کنید و آن ها را شل کنید، این حرکت را از انگشتان خود شروع کنید و یا وقتی که آرام هستید، خودتان را در مکانی دلپذیر مانند ساحل لذت بخش و یا چمن زار آفتابی تصور کنید).
- ✓ مصرف کافئین را قطع کنید. زیرا می تواند علائم اضطراب را بدتر کند.
- ✓ با پزشک خود در مورد امکان استفاده از دارو برای اضطراب صحبت کنید.

❖ توصیه های لازم جهت کم کردن مشکلات بلع

- ✓ غذاهایی که نرم است و حاوی کالری و پروتئین زیاد می باشند را میل نماید (مانند پودینگ، ژلاتین، بستنی، ماست)
- ✓ لقمه های کوچک بردارید، هر کدام را به طور کامل بجوید و قورت دهید سپس لقمه دیگری را بردارد.
- ✓ از نی برای مصرف مایعات و غذاهای نرم استفاده کنید.
- ✓ مایعات غلیظ تر مانند میوه هایی که در مخلوط کن پوره شده اند و یا مایعاتی که به آن ها قوام دهنده اضافه شده است را امتحان کنید.
- ✓ غذاهای له شده یا پوره شده مانند گوشت، غلات، حبوبات و میوه های تازه، به گونه ای که همانند غذای بچه نرم باشند. را مصرف کنید
- ✓ می توانید در صورت نیاز شما به غذاهای خشک، قبل از مصرف، مایعات اضافه نمایید.
- ✓ خرد کردن نان در شیر برای نرم تر شدن آن پیشنهاد خوبی است.



راهنمای پرستاری

توصیه های عمومی پر تودرمانی

- ✓ غذای یخی و یخچالی یا بسیار سرد و ولرم را مصرف نمایید زیرا سرما به بی حسی کمک می کند اگر درد مری با مصرف غذاهای سرد بدتر شد، غذاهای با دمای اتاق را مصرف نمایید.
- ✓ از یخ خرد شده و مایعات در وعده های غذایی استفاده نمایید.
- ✓ وعده های غذایی کوچک و میان وعده ها ممکن است بهتر و راحت تر مورد استفاده قرار گیرند.
- ✓ برخی از داروهای باید با معده خالی مصرف شود. خوردن داروها و قرص ها و مخلوط نمودن آنها با آب میوه، سیب، ژله یا پودینگ ممکن است خطرناک باشند. در برخی مواقع نیز ممکن است داروها به شدت با غذاهای خاصی واکنش دهند (قبل از انجام این کار با پرستار، پزشک و یا داروساز مشورت کنید).
- ✓ از مصرف الکل، غذاها و مایعات داغ و تند اجتناب نمایید.
- ✓ غذاهای اسیدی مانند مرکبات و نوشیدنی ها و نوشابه های گازدار را مصرف نکنید.
- ✓ از مصرف غذاهای خشک و سخت مانند چوب شور، آجیل، و چیپس اجتناب نمایید.
- ✓ برای خوردن و آشامیدن و مدت کوتاهی بعد از آن در حالت نشسته کامل قرار بگیرید.
- ✓ اگر برای شما درد به صورت یک مشکل در آمده است طبق دستور پزشک از ژل لیدوکائین یا استامینوفن مایع برای زخم های دهان استفاده نمایید.